

天養二年二月以宇治入道太相國本移點

移點少四記藤原中亮

比技助教清原定安

醫博士丹波知康重成等相共合醫國象本
文殿所加之勘物師長以墨書之令朱合點

天養二年二月以宇治入道太相國本移點

移點少四記藤原中亮 比技 助教清原定安

我點比技之間所見及之不審直誦中原師長
醫博士丹波知康重成等相共合醫家本
文殿所加之勘物師長以墨書之令朱合點

宇治本

初下點

行盛朝臣 朱星點 墨假字

重加點

重基朝臣 朱星點假字勘物又以朱點句
于儒點

御本不改彼據令點移

醫心方卷第八 手足

從五位上行鍼博士魚丹波介丹波宿禰康賴撰

脚氣所由第一

脚氣形狀第二

脚氣輕重第三

脚氣姑息法第四

脚氣療體第五

脚氣腫痛方第六

脚氣房弱方第七

脚氣入腹方第八

脚氣脹滿方第九

脚氣轉筋方第十

脚氣冷熱方第十一

脚氣灸法第十二

脚氣禁忌第十三

脚氣禁食第十四

脚氣宜食第十五

治脚腫方第十六

治尸脚方第十七

治肉刺方第十八

治手足凍瘡方第十九

治手足發脹方第二十

治手足皸裂方第二十一

治手足逆腫方第二十二

治代指方第二十三

治指刺痛方第二十四

脚氣所由第一

病源論云凡脚氣病皆由感風毒所致也初得此

脚氣新忌藥十三

脚氣藥食藥十四

脚氣宜食藥十五

治脚腫方藥十六

治脚方藥十七

治肉刺方藥十八

治手足凍瘡方藥十九

治手足發脹方藥二十

治手足皸裂方藥二十一

治手足逆腫方藥二十二

治代指方藥二十三

治指刺痛方藥二十四

脚氣所由第一

病源論云凡脚氣病皆由感風毒所致也初得此

病多不即覺或先無他疾而忽得之或曰衆病後

得之

蘇敬論云夫脚氣為病本曰腎虛多中肥溢肌膚

虛者無問男女若瘦而勞苦肌膚薄實皮臃厚

緊者縱患之無死憂一老已後又患之立冷濕地多

飲酒食麴心情憂憤之使發動晉宋已前名為緩

風古來無脚氣名後人以病後脚起初目腫滿故

名脚氣耳

唐侍中論云凡脚氣病者蓋由暑濕之氣鬱積

於內毒厲之風吹薄其外之所致也

徐思恭論云此病多中關樂人忌日久立冷濕地此

病多或踏契來即冷水浸脚或房室過度卧不覆

脚或心情憂苦居契美地此皆實脚氣之證觸也

又云清溫龍虛則病起於下風雨龍虛則病起

於上又身半已上者風中之身半已下者濕中

之此蓋風濕之病也

千金方云凡四時之中皆不得久立坐濕冷之地

不得日酒醉汗七脫衣靴憎當風取涼皆成

又云清溫襲虛則病起於下風雨襲虛則病起

於上又身半已上者風中之身半已下者濕中

之此蓋風濕之病也

千金方云凡四時之中皆不得久立坐濕冷之地

不得日酒醉汗七脫衣靴憎當風取涼皆成

脚氣

又云夫風毒之氣皆起於地之寒暑風濕皆

作蒸氣之常履之所以風毒之中人也必先中

脚也久而不差遍及四肢腹背頭項也

攘要方云此病有數種有飲氣下流以成脚氣

飲氣即水氣之衝亦有腎氣先虛暑月承以

冷水洗脚濕氣不散

亦有腎氣既虛諸事不節日居卑濕之氣上

衝亦成脚氣

脚氣形狀第二

病源論云凡脚氣此病之初甚微飲食嬉戲

氣力如故當熱奈之其狀自膝至脚有不仁或

苦痺或淫如虫行所緣或脚指及膝胫洒

尔脚或居弱不能行或微腫或酷冷或疼

痛或緩緩不隨或有寧急或有至困能飲食

者或有不能食者或見飲食而嘔吐惡聞食

變者或有物如指發於跗腹逆上撞心氣

上者或有舉躄轉筋者或壯熱頭痛者或心

胸衝悸變數不發見明者或復為苦痛

[illegible]

者。或語言錯亂。喜忌誤者。或眼濁精神昏憤。
 者。或不能食者。或見飲食而嘔吐惡聞食
 者。或有不能食者。或見飲食而嘔吐惡聞食
 者。或有物如拍發於胸腹。逆上撞心氣
 上者。或有舉軀轉筋者。或扶勢頭痛者。或心
 胃衝悸。寢處不欲見明者。或腹內苦痛。無下
 者。或語言錯亂。喜忌誤者。或眼濁精神昏憤。
 者。此皆病證也。

唐臨論云此病形僅ハ大同小異或脚冷疼痺
或行急急居弱或兩胫腫滿或胛漸枯細カシ或心中
慄慄直隴反或少腹不仁有或舉體轉筋或見食嘔逆カク

或胃滿氣氣或偏身酸痛皆疝氣候也

痛_レ干_レ足_レ連_レ冷_上或似癰_レ發或似石_レ發_{病也}惡_レ寒_レ壯_レ熱_レ頭

寒脉甚洪急七日已後壯熱既定肺氣壯見也

徐國舉論云此病甚微飲食嬉戲語笑氣力

如故率不令人覺オホシ霍亂之案ハルマ其狀自膝至

膝其間有筋古筋又不仁之虞或脚指及膝胫也

尔或起行脚无敌孱弱不能行或蔽肿酷

冷而稍疼或緩策不隨或患痿急或偏有冷處

此皆肺氣之微

又去初得之時即或脚趺腫或^脚在腫漸^脚之向上

或由來不腫唯緩弱頑痺行卒居倒毒氣陰

上
文
心
半
一
化
了
久
終
日
牛
不
常
氣
下
重
今

入ホテ
セシハ

此皆肺氣之微
或起行肺無故房弱不能行或微腫結
冷而消疼或緩緩不隨或患瘰癧急或偏有冷瘰
此皆肺氣之微

又去初得之時即或肺跖腫或肺腫漸之向上
或由來不腫唯緩弱頑痺行卒屈倒毒氣陰
上攻心皆死此則形證不同皆名肺氣不腫冷

多腫則無熱毒矣

小品方云風毒中人多不即覺或日衆病乃覺也
其狀或有見食飲生憎聞食臭或有腹內痛無

下或胃中衝悸不欲見光明或精神惛憤或喜

妄語錯亂壯熱頭痛或身熱冷消疼或喜舉

轉筋或兩腳夜腫或直痺或膝至脚不仁

時緩緩不隨此皆肺病之證也

千金方云風毒之中人也或見食嘔吐憎聞食臭

或有腹痛下利或大小便秘澀不通或胃中

衝悸不欲見光明或精神惛憤或喜迷妄語

諸言錯亂或壯熱頭痛或身體熱冷疼煩或覺

轉筋或肺不腫或肺腫頑痺不仁或時緩緩

不隨或復百體瘰癧急或小腹不仁此皆肺氣狀

貌也又云其人本黑瘦者易治本肥大亮

厚赤白者難愈

據要方云肺氣皆令人肺腫大腫跖腫重悶甚

者上衝心腫滿悶氣短中間有乾濕者二肺氣

者上衝心腫滿悶氣短中間有乾濕者二肺氣

不隨或復百體^{呂氏云}卒急或小腹不仁此皆肺氣狀
艱也。又云其人本黑瘦者易治本肥大亮
厚赤白者難愈

據要方云肺氣皆令人脚腫大腫跌腫重悶甚
者上衝心腫滿悶氣短中間有乾濕者二肺氣
濕者肺腫乾者不腫漸覺枯燥皮膚甲錯須
細察之

肺氣輕重第三

蘇敬論云凡肺氣病多以春末夏初發動春發
如輕夏重入秋少輕至冬自歇大略如此亦特有
異於此准者。又云凡肺氣脉有三種以緩脉
為輕沉緊為次洪數為下沉緊者多死洪數者
並生緩者不治自老。又云又有不腫而緩

弱行牽屈倒漸至不作毒氣陰上攻心便死急
不旋踵竟延歲月耳

唐臨論云此病腸滿氣上便教人急者不全日緩
者或一二月初得此病便宜速治之不同常病也

徐思恭論云凡脚氣皆有陰陽若兩脚及髀
已來腫滿系之應骨之疼又痛者此名陰陽
脚氣陰陽俱患不宜攻心。則死者十有七
八若兩脚唯緩弱行起不得不腫系之應骨

之疼之痛者此名陰脚氣陰上則死者十有四
五若直皮膚上腫不癢行系之不疼痛者此
名陽脚氣縱上至面及手指三無死憂

已來腫滿系之應骨之疼又痛者此名陰陽
脚氣陰陽俱患不宜攻心之則死者十有七
八若兩脚唯緩弱行起不得不腫系之應骨
之疼之痛者此名陰脚氣陰上則死者十有四
五若直皮膚上腫不癢行系之不疼痛者此
名陽脚氣縱上至面及手指之無死憂
千金方云小兒病惟有異即須須大怖畏哭
意治之之緩氣上入腹或腫或不腫胃弱連
滿氣上肩息急者死不延踵寬者數日必死
不可不急治也但緩心急氣喘不停或白汗數
出或乍寒乍熱其脉促短而數嘔吐不心者皆
死相也

小品方云脉浮大者病在表沉細者病在裏其
脉深大緊駛者三品之中最惡脉也
葛氏方云脚弱滿而痺至少腹而小便不利氣
上者死

脚氣姑息法第四

唐臨論云姑息脚氣法依此消息必得氣愈第
一忌噎之即心之腹之煩之即脚氣發動第二忌大
語之即損肝肺之損之發動又不得露脚當
風入水以冷水洗脚之腫尤不宜冷雖暑月常恒
須著綿襪至冬寒倍令兩脚腫溫煖微有汗是
大佳之法依此將息氣漸得薄損每至日當日割
半足甲五日半甲當日足甲宜十二日一度割之少

一忌噴^ハ即心^ハ腹^ハ煩^ハ即肺氣發動^ハ第二忌大

語^ハ即損肝肺^ハ損^ハ發動又不得露^ハ脚當

風入水以冷水洗脚^ハ肚^ハ尤不宜冷^ハ雖暑^ハ月常恒

須著綿襪^ハ至冬寒倍^ハ令兩脚腔溫暖^ハ微有汗^ハ是

大佳之法^ハ依此將息^ハ氣漸得薄損^ハ每至日^ハ宜日割

手足甲^ハ丑日午甲^ハ寅日足甲^ハ忌宜十二日一度割^ハ少

侵^ハ屏太去氣^ハ又數須用梳^ハ擺頭每梳^ハ髮欲得一百

餘梳^ハ太去氣^ハ每旦長展^ハ脚坐^ハ于攀^ハ脚七度^ハ令平

著脚指漸至^ハ脚心^ハ極踏^ハ于用力^ハ極舉^ハ脚每日如此

肺氣之不傷^ハ人若頭面及項^ハ少似^ハ焚氣^ハ上即露

背膊取冷^ハ使腰脊冷^ハ其背膊^ハ令極冷^ハ然後著

衣必須如此^ハ姑息^ハ必漸老^ハ若不姑息^ハ立見^ハ危殆^ハ困

駕轉加易^ハ發動^ハ便致^ハ性令^ハ雪洗面及脚^ハ皆須

熱湯小添^ハ冷水洗之

蘇敬論云^ハ凡肺氣病人^ハ不能永老^ハ要至^ハ春夏還

復發動^ハ復時^ハ膝理用^ハ不宜^ハ臥睡^ハ覺^ハ令人^ハ按^ハ按勿

使^ハ耶氣^ハ暫^ハ留^ハ數^ハ勞動^ハ開^ハ節常^ハ令^ハ通暢^ハ此並

養生之要^ハ提^ハ拒風邪法也^ハ尋常有^ハ身力^ハ每食後

行五六十步^ハ覺^ハ皆有^ハ汗^ハ微出力^ハ少疲倦^ハ便心^ハ如此

肺中惡氣^ハ隨即^ハ下散^ハ雖加^ハ浮腫氣^ハ不能^ハ上也

肺氣療體第五

徐思恭論云^ハ肺氣之病^ハ療乃百途^ハ故須^ハ原始^ハ要

終^ハ察其形^ハ證^ハ作^ハ穴針灸^ハ當病用藥^ハ如得^ハ其由

略無不^ハ卷

行五六十步覺^背有汗^ハ微出力少疲倦^ハ便心如此^ハ
肺中惡氣隨即下散雖加浮腫氣不能上也

肺氣療體第五

徐思恭論云肺氣之病療乃百進故須原始要
終察其形證作穴針灸當病用藥如得其由
略無不愈

又云肺氣之病不同餘病一患已後難差易^ハ發^ハ訖^ハ
惟不同訖病進藥隨其冷熱旬月有變補^ハ寫^ハ觀^ハ
其虛實皆臨時之宜^ハ不可^ハ純依古方也

蘇敬論云夫療肺氣者須順四時春秋二時宜^ハ寫^ハ
補^ハ寫^ハ夏則疾盛專須汗利或十月以後乃用補

藥雖小變通終不越此法有凡人曾以夏時

見患汗利得差冬時遇病還令汗利或冬見

用補藥得差至夏時遭患遂令用補此並下愚

專固之同穿鑿者也雖懷濟物之心既未深達

之何異以治葛救飢人乎又^ハ今略述病有數

種形證不同每發差異為療^ハ殊^ハ前用經効後

用便增劇一旬之內變^ハ惟^ハ不^ハ等^ハ不可以先方救後發

也又云且脚氣為病不同餘病風毒不退未

宜停藥^ハ以見病者皆以輕疾致^ハ斃^ハ或以病小瘳則

言疾愈瘳藥不服或已服藥而患未退謂藥病

相違乃改為他療皆自取危^ハ殆^ハ

又云凡肺氣病雖苦虛羸要不可補^ハ藥唯宜冬

月酒中用之丸散不可用補服必腫脹非^ハ寫^ハ不^ハ

也。又云且脚氣為病不同餘病風毒不退未
宜停藥此見病者皆以輕疾致斃或以病小瘳則
言疾愈瘳藥不服或已服藥而患未退謂藥病
相違乃改為他療皆自取危殆

又云凡脚氣病雖苦虛羸要不可補藥唯宜冬
月酒中用之丸散不可用補服必臙脹非寫不
差庸醫多不曉如此謂為腎虛多將補藥有不經
剖而斃也若以療脚氣法用療風病則十愈八九
矣如當病用藥終元不差脚氣非死病若不肯療
自取死耳非病能教人也

又云夫有脚氣病不可常服補藥多令數脹累
實則難救也每月之中須三五行利為佳縱常
服藥時取利之宜時取汗當復冷熱消息不
可專一法也覺熱煩口乾頭面熱悶即須取冷
覺頑痺不仁身體強屈冷疼者便煖將息此並
可解尋常飲酒作葱豉酒服之大避風濕兼利
腰脚

又云冷毒盛脹即服金牙熱毒盛脹須服紫雪
平服者單用損擗飲之善患脚氣人或遠行
或在家恒須有金牙紫雪

又云諸毒氣所攻之內則心急悶不療至死若攻
外毒出皮膚則不仁者膏摩之老若未
出皮膚在營衛刺痛者隨痛處急宜灸之三五
炷即差不必要在孔穴也遠方無藥物處急宜灸

平^レ脹者單用損^ハ擗^ハ飲^ハ之善患^ハ肺氣入^ハ或速行
或在家恒須有金牙紫雪

又云諸毒氣所攻^ハ內則心急悶不療至死若攻

外毒出^ハ皮膚^ハ則不仁^ハ者膏^ハ糜^ハ之老若未

出皮膚在^ハ營衛刺^ハ痛者隨^ハ痛處急^ハ宜^ハ灸^ハ之三五

炷即老不必要在^ハ孔^ハ也速方無藥物處急^ハ宜^ハ灸^ハ

之衆明堂無^ハ正父但隨^ハ所苦火艾^ハ微^ハ處痛便消散

醫門方云夫療^ハ肺氣或氣^ハ諸病者則依^ハ證^ハ以^ハ當^ハ

藥對^ハ之若乳石動發則以^ハ理^ハ石藥療^ハ之若大小便

秘^ハ澀則以^ハ利^ハ大小便藥療^ハ之若皮膚虛腫成^ハ水

病者以^ハ水藥療^ハ之餘皆^ハ效^ハ此又云脚氣毒盛非^ハ契

藥不解如^ハ契^ハ甚毒發^ハ松^ハ悸^ハ頭面^ハ契^ハ悶者荊根^ハ汁

或竹^ハ瀝^ハ夜^ハ卧^ハ服^ハ之不過數日風^ハ契^ハ並^ハ差

脚氣腫痛方第六

徐頭^ハ酒方若^ハ能^ハ常^ハ飲^ハ此酒^ハ通^ハ利^ハ腰^ハ脚^ハ嶺^ハ南^ハ常^ハ服

此酒^ハ必^ハ佳^ハ及^ハ卑^ハ遠^ハ處^ハ服^ハ亦^ハ好^ハ又^ハ恐^ハ有^ハ脚^ハ氣^ハ即

宜^ハ服^ハ之

好^ハ豉^ハ三^ハ升^ハ以^ハ美^ハ酒^ハ一^ハ斗^ハ漬^ハ先^ハ取^ハ頭^ハ三^ハ葉^ハ三^ハ曝^ハ乾

內^ハ酒^ハ中^ハ漬^ハ三^ハ宿^ハ便^ハ可^ハ飲^ハ隨^ハ人^ハ多^ハ少^ハ用^ハ滓^ハ傳^ハ脚^ハ良

葛氏方

同之

蕪^ハ療^ハ脚^ハ氣^ハ初^ハ發^ハ後^ハ起^ハ至^ハ膝^ハ脛^ハ腫^ハ骨^ハ疼^ハ者^ハ方

草^ハ麻^ハ切^ハ搏^ハ一^ハ斗^ハ許^ハ石^ハ並^ハ契^ハ鋪^ハ脚^ハ腫^ハ處^ハ厚^ハ裹^ハ日^ハ二^ハ三^ハ

度^ハ易^ハ二^ハ三^ハ日^ハ即^ハ消^ハ醫^ハ門^ハ方^ハ同^ハ之

又^ハ方^ハ秋^ハ月^ハ已^ハ前^ハ有^ハ草^ハ麻^ハ冬^ハ月^ハ則^ハ無^ハ宜^ハ取^ハ蒲^ハ藿

內酒中漬三宿便可飲隨人多少用澤傳脚良

葛氏方
同之

藥療脚氣初發後起至膝腫骨疼者方

草麻切搏一斗許石並契鋪脚腫處厚累日三

度易二三日即消醫門方同之

又方秋月已前有草麻冬月則無宜取蒲藿

根切搏碎酒糟和藥令契三分根一孔糟合魚

令契鋪累如前法二日即消立効只療頑痺不仁

者千金方
同之

唐方以酒糟一斗和塩炙作二分炒令契將故秣乳

累鋪之冷便易以腫消為度

唐療脚氣牽不能行及乾疼不腫自漸枯消或復腫痛

緩弱方

取桃柳槐桑穀五木枝葉各切一斗以水一斛塩五

升煮取五斗浸將膝以下一將得七日差發即浸將

亦良

唐浸脚腫滿及緩弱不仁疼痺等方

柳樹白皮細剉如碁子三大升以水一大石煎取

六斗取一小甕可受一石者內湯甕中以兩木橫

橫着甕底脚踏其上湯不得過三里穴一日

一度易不過三度即消如浸時恒使湯契佳

唐又方如大腫不能行動者方

取松木剉三石赤小豆二斗以水六石煮取一石七斗

取小甕子依前折樹皮浸法若患熱煩不能久

大斗取一小瓦可受一石者內湯瓦中以雨水橫
掩着瓦底脚踏其水上湯不得過三里穴一日
一度易不過三度即消如浸時恒使湯熱佳
唐又方如大腫不能行動者方

取松木剉三石赤小豆二斗以水六石煮取一石七斗
取小瓦子依前折樹皮浸法若患熱煩不能久
浸者紫蘘押之即定之其湯不須易之以糠火溫
用

唐又方如肺氣悶者方

以水煮梓枝葉為湯添冷水塩等和漬肺氣散少
快使脚遂不悶大驗

徐療氣腫方

赤小豆一大升 右生研大麻子汁煮前件小豆令爛
每服令盡此一升甚療腫不限服數多少以消為

度

唐魚脚氣法

石以籠兩具以石灰屑搗渠裏安二寸灰上着炭
火之上着二寸灰上着好塩以脚踏上

蘘療大腫不能行動者方

以水煮松木作湯漬將大神
又方搗烏麻碎水煮漬將脚三火大驗

唐療手足腫滿洪直者大豆煎方

大豆一升淨擇穀樹皮一握橘皮三兩桑根白皮
二握紫蘘莖一握先以水四斗煮大豆取二斗汁

漢療大腫不能行動者方

以水煮松木作湯漬將大神

又方搗烏麻碎水煮漬將脚三大驗

唐療手足腫滿洪直者大豆煎方

大豆五升淨擇穀樹皮一握橘皮三兩桑根白皮

二握紫蘘莖一握先以水四斗煮大豆取二斗汁

去滓待清別以清酒七升共豆汁合煮煎取

七升分為三服如氣力強者日別兩三服力弱者日服

搗驗腫消後忌食大酢

唐療氣腫上至腰小便澁諸藥不効宜服方

亭歷子二兩碎大棗十四枚去核

石以水三升煮取二升分三服

經心方治脚腫滿步行不能衆惡毒水腫牽牛子丸方

方大黃二兩朴消三兩牽牛子七兩批人二兩

干薑二兩半人參二兩橘皮一兩半

右七物搗下篩以蜜和杵春萬杵服如梧子廿九人

微利為度愈腫即止不差盡劑者乃毒方

病廿八種風邪悉愈用甚驗禁冷水猪苓等

捷要方療脚氣遍身腫方

大豆三大升以水二斗煮取五升汁去滓桑根白皮一握切

七顆碎伏苓二兩

右以前豆汁浸經一宿煮取二升去滓添酒二

合內藥中隨多少服之利多量減服

葛氏方云若腫已滿捻之沒指者方

捷要方療脚氣遍身腫方

大豆三大升

以水二斗煮取五升汁去滓

桑根白皮一握切

檳榔三

七顆

伏苓二兩

石以煎豆汁浸經一宿煮取二升去滓添酒二

合內藥中隨多少服之利多量減服

葛氏方云若腫已滿捻之沒指者方

酒若水煮大豆飲汁又恒食小豆

又云若步行足痛不能復動方

煮大豆兩囊盛更燂以熨之

本草云鯉魚生煮食之主水腫脚滿

陶景本草注療脚氣滿急服牽牛子得小便

利无不差崔禹錫食經治脚腫方 煮蔓菁根

蓬傳之即消

又方煮茄苗葉溲脚尤驗

脚氣屬弱方第七

唐云若脚氣屬弱或不能語者宜服此金可消此酒

家為脚氣之要

金牙

碎綿裹

細辛

苗草冬

干地黄

干薑

防風

附子

炮

地床子

菟藿

升麻

各四兩

人參三兩獨活

牛膝

并酒煮

石斛

各五兩

石十四味以酒四斗漬之七日飲二三合稍加之以

知為度此酒家為脚氣之要忘如藥法

蘗白楊樹皮漬酒療脚氣腫心胃滿悶手足緩弱

不能起止方

附子ヒルコシロ 炮 地床子フクナ 荊藿トリノアサ 升麻各四兩 人參各三兩 獨活各二兩
牛膝各五兩 石斛各五兩

石十四味以酒四斗漬之七日飲二三合稍加之以知為度此酒氣為肺氣之要忌如藥法

薤白楊樹皮漬酒療肺氣腫心胃滿悶手足緩弱不能起止方

白楊樹白皮切一大升熬黃 省袋盛

石以酒一斗五升漬三日宿溫服三四合加日二三服至八合能者加之不能者減之無忌若得干者一升以酒一斗七升之服之皆大効

千金方八風散治風虛面青黑去色白月光不見肺

肺氣痺弱方

紫客八分一名肉桂 烏頭二分一名附子 鍾乳四分一名石 暑預四分一名續斷

黃耆四分一名麥門冬 五味二分一名澤瀉 遠志四分一名皮

菟絲子四分一名細辛 龍膽四分一名秦膠 石棗四分一名石

栝子人參一名牛膝 昌蒲四分一名杜仲 伏苓四分一名茯苓

附子五分一名甘草 石解六分一名天雄 干地黄四分一名干

地膚四分一名山茱萸 防風四分一名木 干薑四分一名干

甲解四分一名人參 菊花十三分

世三味下篩酒服方寸匕日三不知加至二

葛氏方治肺氣疼痺房弱不仁特冷特熱方

先取好豉一升三蒸三曝干以好酒三升漬之三宿便可飲隨人多少以滓薄脚其熱得小退也

又方以酒煮豉服之

甲解四 人參五 菊花十三

世三味下節酒服方寸匕日三不知加至二

葛氏方治脚氣疼痺房弱不仁特冷特熱方

先取好豉一升三蒸三曝于以好酒三升漬之三宿便

可飲隨人多少以滓薄脚其熱得小退也

又方以酒煮豉服之

本草云豺皮炙之以蠲病上卷心 主冷痺脚氣

脚氣入腹方第八

蘇方水研紫雪服之三下 今案紫雪方鑑真云若脚氣衝心取
少雨和水飲之又可服紫雪五六兩又可梨乾良

唐氣上急悶欲絕者服生薑汁方

石生母薑合皮搏取二升許汁平旦溫頓服之三卷

廣利方治牢脚氣衝心煩悶亂不識人方

取大豆一大升拭去土以水三大升濃煮取汁頓服半

升不立良久更服半升即愈

蘇徐木依湯若毒氣攻心手足脉皆絕此三難治不得

已作此湯療十四五愈方

吳茱萸六升 木依二顆

石以水一斗并煮取三升去滓分三服相去十五里

許或利或汗便活曾苦毒氣殆死仍此方服得

老此藥甚之起死 又方无茱萸木依處可取
茱萸葉一把煮服之

蘇治氣入人腹攻心諸脉並絕不識人面服牛尿方

烏特沙尿一大升

右取新尿溫者服令盡即得利目便眼明識人

雖不能大之療氣然一時救死餘無加也

許或利或汗便活曾苦毒氣殆死仍此方服得

老此藥甚之起死

又方无菜莫木依處可取
菜莫葉一匙煮服之

蘇治氣入人腹攻心諸脉並絕不識人面服牛尿方

烏特沙尿一大升

右取新尿溫者服令盡即得利目便眼明識人

雖不能大之療氣然一時救死餘無加也

徐治腫從肺始轉上入腹則斂人猪肝散方

生猪肝一具細切

石以淡蒜蘆食令盡大肝不盡分贈二服即消

又方以煮單食之

又方蘇云猪完細切作贈搏蒜蘆食日三數日

即氣毒上風除能行

唐犀角湯療腫已消猶遍身頑痺毒氣已入衝心

悶吐逆不下食或腫未消仍有此候者先服此方大驗

犀角二兩大棗七升枚碎香豉一升綿裹些蘇莖一握

生薑二兩

石以水八升煮取二升八合分三服相去十里頻服三

劑以氣下為度

唐若氣攻心此方甚散氣極驗

大檳榔七枚生薑二兩橘皮吳茱萸紫蘆

木液各一兩石以水三升煮取一升三合分再服

捷要方療肺氣攻心悶腹脹氣急欲死方

吳茱萸三升木液切三合檳榔廿顆碎竹葉切二升

水一斗二升煮取三升分溫三服得快痢即老慎生

唐若氣攻心此方甚散氣極驗

大損榔七枚 生薑二兩 橘皮 吳茱萸 紫蘇

木液各一兩 右以水三升煮取一升三合久再服

捷要方療脚氣攻心悶腹脹氣急欲死方

吳茱萸三升 木液切三合 檳榔廿顆 碎竹葉切二升

水一斗二升煮取三升分溫三服得快痢即老慎生

菜契麵蕎麥蒜

脚氣脹滿方第九

蘇徐療身體浮腫心下脹滿短氣小便澀客飲食方

大豆一斗以水三斗煮取一斗七升去豆內清酒一斗和

煎之令得一斗七升許調適寒溫一服一升日三服甚佳

今案耆婆方大豆三升酒一升水無升數

蘇桑根湯主通身體滿小便澀上氣心下淡冰不能食

則腹滿者方

桑根白皮五升大豆五升石以水三斗煮取一升去滓分三

服之

蘇徐療腫已入脰股至腹脹小便澀少者方

大麻子一斗 赤小豆五升

右以水三斗煮豆爛飲汁食豆日三不食餘食不

更為之

又方穀樹白皮切一大斗桑根白皮切一大斗入大深者

右以水五大斗煮取二大斗去滓內大豆二升小豆三升

紫蘇莖葉切一大升生薑切五兩物煮取豆

爛止渴飲汁飢食豆即小便利腫消又能療面

更為之

又方穀樹白皮切一大斗云桑根白皮切一大斗入大深者

右以水五大斗煮取二大斗去滓內大豆二升小豆三升

紫葍イヌエ莖葉切一大升綿裹生薑切五兩物煮取豆

爛止湯飲汁飢食豆即小便利腫消又能療面

目浮腫救急

徐唐亭歷丸療小便澀少腹滿不下食飲方

亭歷子五兩八二廿一緩火熬令紫色去皮杏仁二兩半去皮大棗廿枚

取肉先搗亭歷子一升別取杏仁去皮和搗一千

杵然後取亭歷子物トラス和搗一升杵和トラス丸平旦空腹

服八九丸晚間服五丸二日後小便當利三四日後平

旦服五丸晚間服五丸如梧子以白飲送禁食鹹ツラツキ

之物

治脚氣冷熱方第十

唐治脚氣熱煩口乾頭面熱方

好香豉一升以水四升煮取二升停冷去滓薄頻服之推要

蘇治若覺食氣攻喉方

當食生菜葉五十粒即散

徐療冷氣非冷熱之氣治方

大蒜一升去皮心以酒三升大升緩火煎汁一升許去滓每服

一盞子日三大去氣但多服即覺眼中爛於方生熱

唐云已覺暑肺氣宜服此方

蘇三升去心切豉一大升香桃人小一升去皮

當食生菜莫五十粒即散

徐療冷氣非冷熱之氣治方

大蒜一升去皮心以酒三升緩火煎汁一升許去滓每服

一盞子日三大去氣但多服即覺眼中煖於多煖也生熱

唐云已覺暑肺氣宜服此方

蘇三升去心切豉一大升香桃人小一升玄皮

右三味合和生絹袋盛以酒一斗漬之夏三日冬

日初服半升漸加至二升量增減若盡更著五升

酒漬飲之加枳一二合急好

肺氣轉筋方第廿

論云凡肺氣初轉筋者灸萊蕪萊山二穴

龍門方療肺轉筋及入腹方

取木依子根荃煮湯服並驗

又云療轉肺筋及入腹方

半物隨所患時大梅拍灸當肺心急筋上七壯

又云筋已入腹者令患人伏地以繩絆兩脚上踝下

兩脚中間以繩繫柱去地稍高患者身去柱可五尺即

已捧極折繩令制患者驗

華他方治轉筋方

以白載者救令一沸目以洗足至足愈小品方

之玉酢并及米汁也

脚氣灸法第廿三

蘇唐云凡脚氣發有陰陽表裏當隨狀療之不可

要依古方也患陽療陰病表救裏皆為重虛重實

危殆甚也若病逆陰發起由足大指側向上迎膝內及

華他方治轉筋方

以白載昨并及米汁也煮粉令一沸目以洗足腓至足三愈注小品方

之玉酢并及米汁也

脚氣灸法第三

蘇唐云凡脚氣發有陰陽表裏當隨狀療之不可
要依古方也患陽療陽病表救裏皆為重虛重實
危殆甚也若病從陰發起由足大指側向上迴胫內及
股裏頑痺不仁或腫先灸於此者皆須隨病灸療須
灸復留中都陰陵泉曲泉等諸穴灸先從上始以向
引其氣使下各灸廿壯自後胛白灸七壯取老止餘
皆依此若病從陽發起由足小指傍外側向上迴胫外從
絕骨至風市頑痺不仁或腫起於此者須灸陽輔絕骨
陽陵泉風市等諸穴灸數及從上向下皆依前法若
氣毒無行表裏者乃可量其輕重隨灸膏摩之
若上下遍發不知的處者宜灸上廬下廬維口三里各
灸一二壯以通洩之其用藥內攻各量病投藥也逐遍
苦處恒使灸瘡不差為佳風氣都除乃隨瘡老
後瘡色赤者風毒盡青黑者猶有毒氣仍灸勿止待身
體輕利然後可休矣又一本云常須灸三里絕骨勿令
瘡老佳

陽陵泉二穴在膝外側骨下宛陷中是蘇徐

絕骨二穴在外踝正上尋小骨頭絕陷中是同前

風市二穴平足垂手當中指頭脰中兩筋是同前

崑崙二穴在外踝後跟骨上陷中是同前

陽輔二穴在絕骨前丰寸下是蘇徐云明堂無絕骨名有陽輔

瘡老佳

陽陵泉二穴 在膝外側骨下宛陷中是同前 瘡徐

絕骨二穴 在外踝上尋骨頭絕陷中是同前

風市二穴 平臑垂手當中指頭脰中兩筋是同前

崑崙二穴 在外踝後跟骨上陷中是同前

陽輔二穴 在絕骨前丰寸少下是瘡徐云明堂無絕骨名有陽輔

上廉二穴 在三里下三寸是瘡徐

下廉二穴 在絛口下寸是瘡徐

瘡口二穴 在上廉下寸是瘡徐

犬衝二穴 在足大指本節後二寸是或云一寸半瘡徐

犢鼻二穴 在膝蓋上外角宛中是瘡徐

膝目二穴 在膝蓋下兩邊宛中是瘡徐

三里二穴 在膝蓋骨頭側下骨外三寸下宛中

曲泉二穴 在膝內屈文頭是

陰陵泉二穴 在中膈膝內側骨下宛中是瘡徐

中都二穴 在陰陵泉三文中間是瘡徐

三交二穴 在內踝上三寸是瘡徐云名大澤

復留二穴 在內踝上二寸是瘡徐云名兼今

少陽二穴 在內踝後寸動筋中是瘡徐

三陽二穴 在內踝上八寸骨下陷中是瘡徐

陰踗二穴 在內踝下向前宛中是瘡徐

委中二穴 在膝後屈中央是瘡徐

臑筋二穴 在臑當中心滿中是瘡徐

臑山二穴 在臑脇下際分內間陷中是瘡徐

臑泉二穴 在臑心是瘡徐

少陽二穴

在內踝後可動筋中是

三陽二穴

在內踝上八寸骨下陷中是

陽蹻二穴

在內踝下向前宛之中是

委中二穴

在腓後屈中央是

承筋二穴

在腓當中心滿中是

承山二穴

在腓腸下際分肉間陷中是

踴泉二穴

在脚心是

石件穴並要不可忽能灸其最要有三里絕骨

承筋大衝崑崙踴泉患者不可不灸

凡患脚氣法皆春發夏甚秋輕冬歇大法春秋

宜灸冬老可行夏不可夏既瘡敗又不得看

衣風冷目入及更增病冬特血溢又逢天理急不

得已无藥物處可灸一二穴不可遍體多灸也

凡脚氣病大論毒從下上之從上向下者或云灸上

毒便止誤矣此見毒氣攻亂疼痛如刺隨病

即灸火徹便瘳不物上下

凡所衝如賊欲出得穴即出豈在大門也風氣所致

三復如是皆此經誠方不失一必不為件耳

曹氏方云其灸法凡穴亦甚多恐人不能悉知處

今止疏要者必先從上始若直灸脚氣上不泄則

危矣

大推一穴 灸百壯 肩井二穴 各灸百壯 臍中一穴 灸五十壯

一穴 灸百壯 凡灸此上部五穴亦足以泄其氣若能灸

百會風府胃管及五藏俞亦佳視病之寬急

此方有

今上疏要者必先從上始若直灸肺氣上不泄則

危矣

大椎一穴灸百壯肩井二穴各灸百壯膺中一穴灸五十壯

一穴灸百壯凡灸此上部五穴亦足以泄其氣若能灸

百會風府胃管及五藏俞亦佳視病之寬急

耳

次風市二穴灸百壯三里二穴灸二百壯上廉二穴灸百壯下廉

二穴灸百壯絕骨二穴灸二百壯

凡此下部十六並至要猶餘伏菟犢鼻耳

凡灸此壯數不必煩畢三日中報之令竟

千金方云凡病一腳則灸一腳兩脚便灸兩脚也

又云初得脚弱便速灸之并服竹瀝湯灸訖可

服八風散無不老者唯速治之若人但灸而不服散

而不灸如此者有半死雖得老者或至一

二年復更灸動輒見得便依此治速灸之服散

者治之愈竹瀝湯八風散在上

脚氣禁忌第十三

藥唐論云醉酒房室久立冷濕地船行水氣復

月屋中濕氣契蒸氣勞劇失治憂憤如斯等

類好使氣發也

又云不用乘馬若能步行勞動其肺氣自然漸羸

又云晝日莫多卧須力起遨遊舒暢情性勿恐

睡也

千金方云肺氣之病極須慎房室又忌大怒

睡也

月屋中濕氣濕分契美氣勞劇失法憂憤乱也如斯等類好使氣發也

又云不用乘馬若能步行勞動其肺氣自然漸羸

又云晝日莫多卧須力起遊遊舒暢情性勿思

睡也

千金方云肺氣之病強須慎房室又忌大怒

要方云凡患肺氣尤不宜眠睡宜數々行散浮

腫氣不宜服補藥每月須宜洩佳

肺氣禁食第十四

蘇唐論云不宜食麵半肉蘿蔔葵蔓菁韭

又云不得食酢餅

千金方云羊宗牛宗菓蔬菜菰菜蔓菁瓠子

涓麵藕油乳糜猪鷄鴨並切禁

又云不得食諸生菜子酸之食犯之者皆不可

羗

肺氣宜食第十五

蘇唐云常宜食攪肉攪蹄鯉魚鯉魚猪肉莞肉

葱芥薤韭等及猪肝肺食法先湯中燂使饒

熱切作齏以醬汁和水并著一抄半葱薑枳實

令揉熟每食下飯大之補益得消肺氣生薑蔥

蒜常食大佳

千金方云唯得食粳粳粟米將胃致葱薤枳薑

播皮

醫門方云食生牛乳生栗子諸下氣之物為佳

契切シコウ作膏以薑汁和水并煮一抄半葱薑シロ枳實

令極搗熟每食下飯大補益得消肺氣生薑葱太薑

蒜常食大佳

千金方云唯得食粳稞粟米シホ將目致葱薤枳實

播皮

醫門方云食生牛乳生栗子諸下氣之物為佳

陶景本草注云背肺弱人往栗樹下生食數升便

能起行

食經云昆布崔禹云治手麻肉崔注云鯉崔禹云主

石決明時諸病

治足腫方第十六

病源論云種玉時種及腫足也切時死又足腫病

也病者自膝已下至踝及指俱腫直是也皆由

血氣虛弱而耶傷之經絡不流而成亦言江東諸

山縣人多病腫云彼云有草名種草人行誤踐

之則令病腫之

錄驗方治脚腫方

掘堅實地坎作可容脚深沒脚燒燒坎令赤以尿

投坎中以繩纏膝下仍以甘力遍披腫上瀝血令

患傷血出仍內契坎尿中至脚漬腫塞坎上令密

勿令氣出地冷方出脚

葛氏方治足忽得腫病腓脛暴大如吹頭痛寒

熱筋急不即治之至老不愈方

隨病痛所在左右足對內踝直下白肉際灸三炷即

投坎中以繩纏膝下仍以寸力遍披腫上瀝血令
患傷面出仍內熱坎尿中至時漬種塞坎上令密
勿令氣出地冷方出時

葛氏方治足忽得癰病腓胫暴大如吹頭痛寒
熱筋急不即治之至老不愈方

隨病痛所在左右足對內踝直下白肉際灸三壯即
愈後發更灸故處

又陶氏初覺此病之始股內間發有腫處或大脉
脹起或胫中物急煎寒不決者當撿乘其病

處有赤脉血路仍灸絕其絳兩三處之廿一壯未已
豆豉少之雜艾為灸主

若以下至踝間可依葛氏法如其壯至五十亦用藥
艾丸也如此應著

若數日不愈便以月刀破之第四第五指間脉處
并踝下骨解泄其惡血之皆作赤色去一斗五升

亦无苦若在餘處亦破之而角賴去惡血都畢
傳此大黃膏勿令得風水乃令服白頭公酒其

經易治且如此若良久不著更著大方
大黃膏方

大黃附子 細辛 連翹 巴豆 水蛭 苦酒
淹一宿以臈月猪膏煎三上三下去滓以傳之

亦可酒服如此杏核

白頭公酒方

白頭公二兩 甘草一兩 牛膝二兩 海藻二兩

大廣膏方

大黃附子ニラノネ 細辛ニラノネ 連翹イタナセ 巴豆ヒル 水蛭ヒル 苦酒ヒル

淹一宿以臘月猪膏剪三上三下去滓以傅之カ 亦可酒服如此杏核七不

白頭公酒方

白頭公二兩 甘草一兩 牛膝二兩 海藻二兩ハク

石斛兩 干地黄兩 土依根兩 附子三兩

葛根一兩 麻黃二兩

十物以酒二斗漬五日服一合稍至三四合又麻治

葛膏亦佳

老嬰方

判內踝上太脉血者即差 又方灸外踝尖

治尸脚方第十七

病源論云尸脚者脚跟圻破也亦是冬時觸犯

寒氣所以如然又言脚踏死尸所卧地令脚破也

葛氏方治脚無冬夏恒圻裂者名尸脚踰死尸

所致方取雞矢一升水二升煮數沸漬洗之半日

乃出數作差千金方

新錄方治尸脚方

大麻子煮傷漬之 又方搗馬寬ムナヒ汁洗或煮漬

之

又方煮蔓菁根漬之 又方車脂アララ塗之

治肉刺方第十八

病源論云肉刺者脚指間生肉如刺謂之內刺由

新錄方治尸疔方

大麻子煮傷潰之 又方搗馬寬汁洗或煮潰

之

又方煮蔓菁根潰之 又方車脂塗之

治肉刺方第十八

病源論云肉刺者脚指間生肉如刺謂之內刺由
著靴忍小指相揩而生

新錄方治肉刺方

穀之塗藥也 又方對糖稍刮也 又方塩湯潰之

又方酢摩之至消又方漿汁塗刮去又方燒金

銀釵燂之 又方薑陰香流黃等分合研量

大少可刺著烙之

救急單驗方療脚下定刺方

削令頭破血出取丹如來許拊託裏老

又方以刀子刮去刺即以書墨研之數十迴永

大老驗

治手足凍腫創方第十九

病源論云凍爛腫創嚴冬之月觸冒風雪寒

毒之氣傷於肌膚血氣壅滯目即大素注竹玉及

中寒瘡也瘡凍爛赤疼腫便成凍創乃至皮肉

爛潰重者支節墮落

葛公方治手足中寒雪凍腫創爛方

東膏溫令契以灌之洋鴈雜塗之佳

又方溫鴈蘆汁潰之又方契煮小便以潰之

毒之氣傷於肌膚血氣壅滯目眦大赤注竹王

中寒瘡也瘡凍爛赤疼腫便成凍創乃至皮肉

爛潰重者艾節墮落

葛公方治手足中寒雪凍腫創爛方

東膏溫令契以灌之洋脂雜塗之佳

又方溫賊道汁漬之又方契煮小便以漬之

又方燒黍粟若麥葉作灰以水和煮令契

穿器盛於甕中滴創上半日中為之

千金方云若冬月胃涉凍水面目手足緣燥乃始

契痛欲瘰者取麥葉令煮濃汁契洗之

又云凍拍欲墮方

馬矢三升水三升煮令沸漬半日愈經心方同之

新錄方

契翅散粉上 又方煮松葉洗之

集驗方治凍瘡方 以蠟洋灌之

治手足皸裂方第廿

病源論云皸裂者肌肉破也言冬時觸胃風寒手

足破故謂之皸裂也

葛氏方治冬天手足皸裂血出及瘰凍方

取麥苗煮令濃契的之尔以洗漬之

千金方治手足破裂血出疼痛方

猪脂著契酒中以洗之即差

集驗方手足瘰燥方

蜀樹四合水一斗煮三沸去滓以洗漬之

漢文本草主 藥曰皮以真之切

取麥苗煮令濃。熱的シカニチ以洗漬之。

千金方治手足破裂而七疼痛方

猪腿著契酒中以洗之即差上

集驗方手足瘰癧方

蜀樹四合以水一斗煮三沸去滓以洗漬之

漢敬本草注 爵白芨以填之効

范汪方

取葱葉薑黃葉煮以漬洗之良

新錄方 咋蒜封之 又方車工脂塗之

治手足發腫方第一

病源論云人手足忽然皮厚澁而圓強如蠶者謂

之疥癩此由血氣沉行不榮其表故皮澁厚

而成也

葛氏方手足忽發腫方

取染米粉鐵鎔ナニ焚令赤以眾人唾和之以塗

上厚一寸即消范汪方

玉筋稍方以鹽塗腫上令半乾之不過三

又方作艾炷灸其上三壯

新錄方 以溫尿漬髒

治手足逆腫方第二

病源論云逆腫者手足凡甲際皮刺起謂之逆腫

風邪入於腠理血氣不和故也

千金方手足逆腫方

五青珠一分 干薑二分搗以粉瘡上日三今桑葛

氏方是

新錄方 以溫尿漬髑

治年之達臙方第廿二

病源論云達臙者年之凡甲除皮利起謂之達臙

風邪入於腠理血氣不和故也

千金方年之達臙方

五青珠一分 干薑二分 搗以粉瘡上日三

名琅玕者赤以
猪脂和塗之

枕中方治人年之廉理方 取榆樹孔中水洗即

細如指

治代指方第廿三

病源論云代指者其指先腫攸之熱病其色不黯

然後方緩凡甲過結膿割者凡甲脫也亦名代甲

亦名糟指亦名去寬夫凡者筋之餘也由筋骨

熱感濕不通故腫結生膿而凡甲脫去

小品方治代指法

單煮甘草湯之若元具草內世消汁漬之但

結得一種冷藥之草菜汁漬漬之

九升煮取
一升云云

葛氏方代指方

煮地榆根作湯漬之半日甚良

又方以指刺炊飯中三七遍良

又方以泥之指令通連厚寸許以內契灰中已

之泥燐假視指皮爛者即愈也不爛者更為

之

葛氏方代指方

奠地揄根作湯漬之半日甚良

又方以指刺炊飯中三七遍良

已上千金方同之

又方以泥之指令通連厚寸許以內契灰中已

之泥煖俛視指皮爛者即愈也不爛者更為

之

千金方代指方 麻沸湯漬之即愈

又方先刺去膿灸鮮皮令溫以繩裹周連痛

心便愈 又方取婁黃惹葉煮漬之

又云割甲侵完成漏不老方 付樊石末裹之以老

為限

又方搗鼠黏草根和猪脂付取老心

新錄方代指方

酢和契灰刺日二三 又方塩湯漬之良

集驗方代指方

單煮甘草漬之 又方用芒消汁漬之

僧深方代指方 作艾主心灸痛上七壯

治指制^{七寸}痛方第廿四

醫方指忽制痛不可堪轉上入方

灸病指頭七壯^老 千金方同之

又云指端忽發瘡方燒鐵令赤以灼之

又云卒五指筋^急不得屈申方灸手踝骨

上數狀

千金方指制^{七寸}痛方嚼^{清和蜜}溫塗之愈^{注心方}

醫方指忽制痛不可堪轉上入方

灸病指頭七壯千金方同之

又云指端忽發瘡方燒鐵令赤以灼之ヤリ

又去卒五指筋卒急不得屈申方灸手踝骨

上數狀

千金方指制痛方嚼シロ清和蜜溫塗之愈經心方同之

又云指疼欲脫方ヒニク

猪脂和塩吹者灸消契之內指之凡中食又ヤリ老ヒニ

醫心方卷第八